

Messwert 1 Schmerzpunkte: Schmerzsкала 0-10; 0= keine Schmerzen; 10=extreme Schmerzen

Messwerte 2-5 Beweglichkeit: Abstand Fingerspitzen zum Boden in cm;

Minusbereich bedeutet: Patient kommt weiter wie mit den Fingerspitzen zum Boden herunter

Patient: Alexander Jakob; männlich; akuter Bandscheibenvorfall


vor spineFIT-Behandlung: Schmerzsкала 7; Socken anziehen kaum möglich; ebenso kein Sport mehr möglich

		Messwert 1		Differenz	Messwert 2 in cm		Differenz
		Schmerzpunkte vor Behandlung	Schmerzpunkte nach Behandlung	Schmerzpunkte	nach vorne beugen vor Behandlung	nach vorne beugen nach Behandlung	nach vorne beugen
Behandlung	1	04.01.2021	7	8	26	18	8
Behandlung	2	05.01.2021	4,5	6	-1,5	10	-1
Behandlung	3	06.01.2021	4,5	6	-1,5	13	-4
Behandlung	4	07.01.2021	4	5	-1	10	-4
Behandlung	5	08.01.2021	3	4	-1	0	-5
Behandlung	6	10.01.2021	3	3,5	-0,5	9	3
Behandlung	7	11.01.2021	3	3	0	3	-7
Behandlung	8	14.01.2021	1,5	2,5	-1	-3	-2
Behandlung	9	17.01.2021	1,5	2,5	-1	-3	-5
Behandlung	10	18.01.2021	1,5	2	-0,5	-5	-4
Behandlung	11	21.01.2021	1	1,5	-0,5	-5	-1
		Differenz Behandlung 1 zu letzter Behandlung		5,5	Differenz Behandlung 1 zu letzter Behandlung		30
		Durchschnittliche Verbesserung pro Behandlung		0,5	Durchschnittliche Verbesserung pro Behandlung		2,727272727

■ Verbesserung
■ gleich geblieben
■ Verschlechterung

Fazit nach spineFIT-Behandlung:

innerhalb von 10 Tagen nach akutem Bandscheibenvorfall nahezu schmerzfrei
 nach 8 Behandlungen nahezu schmerzfrei
 Schmerzsкала von 7 auf 1 in 10 Tagen
 Beweglichkeit hat deutlich zugenommen



Messwert 1 Schmerzpunkte: Schmerzsкала 0-10; 0= keine Schmerzen; 10=extreme Schmerzen

Messwerte 2-5 Beweglichkeit: Abstand Fingerspitzen zum Boden in cm;

Minusbereich bedeutet: Patient kommt weiter wie nur mit den Fingerspitzen zum Boden herunter